

# CLOROFENOL PÓ

desinfetante, bactericida e fungicida



## Descrição e modo de ação:

CLOROFENOL PÓ é um moderno desinfetante clorado à base do Ácido tricloroisocianurico. Este princípio ativo fornece ao produto um teor de 5% de cloro ativo livre e vem associado ao ácido fênico a 0,5%, que tem como função promover um rebaixamento do pH para que haja uma liberação total do seu princípio ativo durante sua utilização.

O Ácido tricloroisocianurico, como princípio ativo do produto, tem como principal vantagem em relação aos demais compostos clorados o fato de liberar como agentes desinfetantes, após o rebaixamento do pH, o dióxido de cloro e o oxigênio nascente, que são dois potentes agentes desinfetantes oxidantes. Esta característica é importantíssima, pois assegura ao produto ação em quaisquer condições de higiene local, por sofrer pouca interferência da matéria orgânica presente.

## Composição:

Cada 100 g do produto contém:

Cloro ativo .....	5,00 g
Fenóis .....	0,50 g
Excipientes q.s.p.....	100,00 g

## Indicações:

Como desinfetante geral, desodorizante, polvilhamento da cama de frangos para diminuição da contaminação ambiental e do índice de amônia, polvilhamento de ninhos de matrizes e avós, nebulização de ambientes, nebulização sobre aves, lavagem de ovos e tratamento da água de bebida ante fungos e bactérias tais como: **E coli, Salmonella spp, Pseudomonas spp, Proteus spp, Klebsiella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Penicillium spp, Microsporium spp, Aspergillus flavus, Aspergillus niger e Aspergillus fumigatus.**

## Modo de usar e posologia:

Lavagem e desinfecção .....	1 : 1.000
Nebulização de ambientes .....	1 : 1.200
Nebulização sobre aves .....	1 : 500
Lavagem de ovos .....	1 : 500
Tratamento da água de bebida .....	1 : 5.000

Diluir em água nas seguintes proporções:

### Polvilhamento da cama de frangos

Utilizar 10 kg do produto para cada 1.000 m<sup>2</sup> de área, de preferência por volta da quinta semana. Polvilhar o produto o mais uniformemente possível por toda a área e revolver a cama.

### Polvilhamento de ninhos

Utilizar aproximadamente 10 g do produto por unidade a cada 15 dias (cerca de 1 colher de sopa cheia).

**Obs.:** Os compostos fenólicos existentes no produto têm a função de promover um abaixamento do pH, entre 4 e 5, na solução onde o produto for diluído, para aumentar a efetividade por meio de uma maior liberação de cloro. Em regiões onde a água for alcalina, a quantidade de fenol do produto pode ser insuficiente para promover o abaixamento do pH; recomendamos adicionar à solução 4 litros de vinagre comercial para cada 1.000 litros de água.

## Apresentação:

Barricas com 30 kg do produto e caixa com 20 potes plásticos de 1 kg.  
Acompanha dosador de 100 g.