DESTRESS
injetável
sedativo específico para suínos

Composição:

Cada 100 mL do produto contêm:
Azaperone ..... 4,0 g
Veículo q.s.p. .....100,0 mL

Indicações:

DESTRESS INJETÁVEL está indicado nos seguintes casos de sedação de suínos: reagrupamento de porcos, porcas agressivas, situação de stress, excitação durante o parto, colapso cardíaco agudo, intervenções diagnósticas e terapêuticas e pré-medicação anestésica local em pequenas intervenções cirúrgicas.

Modo de ação:

DESTRESS INJETÁVEL é um produto de ação neuroléptica, específico para suínos, provocando sedação psicomotora com narcose. As reações de defesa, agressão, fuga, etc., são reduzidas ou até mesmo completamente inibidas.
O produto tem excelente campo de aplicação na suinocultura, na diminuição da agressividade e socialização de suínos recém-agrupados.
DESTRESS INJETÁVEL é também utilizado como anestésico local para pequenas intervenções cirúrgicas. O efeito máximo do produto se observa 5 a 15 minutos após a injeção em animais jovens e em 30 minutos em animais adultos, durando em torno de 1 a 3 horas, dependendo da dose e do peso do animal. Nos primeiros minutos após a injeção, recomenda-se deixar os animais em completa tranqüilidade para a obtenção de um melhor efeito do medicamento. Após 16 horas, o produto é completamente eliminado do organismo do animal. DESTRESS INJETÁVEL é um produto absolutamente seguro, podendo ser utilizado em suínos de qualquer idade e em fêmeas em gestação. Sua margem de segurança é de 20 vezes a dose terapêutica.

Modo de usar e posologia:

DESTRESS INJETÁVEL deve ser administrado por via intramuscular profunda. Para isso, usar uma agulha longa, que será introduzida verticalmente atrás da orelha, nas costas ou na coxa. Nos casos em que a injeção é realizada no tecido adiposo, a sedação pretendida não é atingida.

A posologia básica segue as especificações abaixo, em mililitros por kg de peso:

Porcas agressivas	1 mL para cada 20 kg de peso
Reagrupamento	1 mL para cada 20 kg de peso
Stress	0,5 mL a 1 mL para cada 20 kg de peso
Distrofia muscular	0,5 mL a 1 mL para cada 20 kg de peso

Intervenções obstétricas:

Cesariana com anestesia local	1 mL a 2 mL para cada 20 kg de peso
Sobrecarga cardíaca	1 mL a 2 mL para cada 100 kg de peso

Obs.: Em porcos não castrados, não ultrapassar 1 mL para cada 20 kg de peso.

Período de carência:

Não abater os animais para consumo humano antes de decorridas 24 horas da última aplicação.

Apresentação:

Cartucho contendo 5 frascos de 20 mL.

DES-FAR LABORATÓRIOS LTDA.
DES-VET DIVISÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS.
Rua Eponina, 412 - CEP 03426-010 - São Paulo - SP
Tel./Fax: (11) 2941-5923 www.desfar.com.br