

# DUOCOX

pó solúvel



<b>Descrição:</b>	<p>DUOCOX é um coccidiostático curativo de amplo espectro, contendo dois coccidiostáticos comprovados: amprólio e sulfaquinoxalina. Os dois coccidiostáticos combinados no produto DUOCOX tendem a se complementar mutuamente e assim proporcionar uma eficácia global de espectro mais amplo no tratamento de surtos de coccidiose quando comparado com o uso de amprólio ou sulfaquinoxalina isoladamente. O modo de ação do amprólio pode ser explicado por seu antagonismo com a tiamina, sendo esta vitamina essencial para o ciclo da coccidia. Sua falta provoca sua paralisação e a conseqüente eliminação pelo organismo. Com relação à ação da sulfaquinoxalina, sabe-se que ela atua na inibição da síntese do ácido paraminobenzóico, o que confere a ela também um efeito coccidiostático.</p>						
<b>Composição:</b>	<p>Cada 300 g do produto contêm:</p> <table><tr><td>Amprólio (cloridrato) .....</td><td>100,00 g</td></tr><tr><td>Sulfaquinoxalina (sódica) .....</td><td>100,00 g</td></tr><tr><td>Veículos q.s.p. ....</td><td>300,00 g</td></tr></table>	Amprólio (cloridrato) .....	100,00 g	Sulfaquinoxalina (sódica) .....	100,00 g	Veículos q.s.p. ....	300,00 g
Amprólio (cloridrato) .....	100,00 g						
Sulfaquinoxalina (sódica) .....	100,00 g						
Veículos q.s.p. ....	300,00 g						
<b>Indicações:</b>	<p>DUOCOX está indicado para o tratamento e a prevenção da coccidiose das aves causada por <i>E. bruneti</i>, <i>E. acervulina</i>, <i>E. maxima</i>, <i>E. necatrix</i> e <i>E. tenella</i>.</p>						
<b>Modo de usar e posologia:</b>	<p>DUOCOX deve ser administrado na água de bebida na proporção de 25 mg por quilo de peso vivo da associação amprólio-sulfaquinoxalina ao dia durante 7 dias ou 300 g do produto para cada 1.000 litros de água durante um período de 7 dias.</p>						
<b>Período de carência:</b>	<p>Aves 10 dias antes do abate.</p>						
<b>Apresentação:</b>	<p>Caixa contendo 6 kg do produto (fracionados em sachês aluminizados de 300 g).</p>						