

FENBENAVE

Vermífugo

para aves a base de Fenbendazole



Descrição:

Atualmente há uma grande variedade de anti-helmínticos, principalmente distribuídos entre os grupos dos benzimidazóis, avermectinas, pirimidinas, organofosforados e imidazotiazóis. Infestações por nematódeos são responsáveis por grandes prejuízos na avicultura comercial, provocando retardo no crescimento dos animais, aumento nas taxas de mortalidade e morbidade observadas na propriedade.

O fenbendazole é uma excelente opção para uso como anti-helmíntico, com eficácia demonstrada contra nematódeos, em uma grande variedade de espécies animais.

Quimicamente, o grupo dos benzimidazóis possui estrutura básica composta por um composto orgânico heterocíclico aromático proveniente da fusão do benzeno e do imidazole, com uso destacado como parasiticida interno.

Composição:

Cada 100 g de produto contém:

Fenbendazole	6,00 g
Excipiente q.s.p'	100,00 g

Indicações:

FENBENAVE está indicado para o controle das principais verminoses das aves; nematódeos e cestódeos tais como:

Ascaridia galli, *Heterakis gallinae*, *Capilaria* spp, *Strongyloides avium*, *Choanotaenia infundibulum*, *Syngamus tracheae*

Modo de ação:

O mecanismo de ação dos benzimidazóis está relacionado à inibição do transporte e metabolismo da glicose, interferindo na produção de energia, reduzem a enzima fumarato redutase, reduzindo a geração de energia em nível mitocondrial e, causam degeneração dos microtúbulos, promovendo a inibição conjunta da acetilcolinesterase do parasita. A baixa solubilidade dos fenbendazole em água, aumenta sua ação antiparasitária ao permitir maior contato do fármaco com os parasitas na luz intestinal e, à medida que o medicamento é absorvido, o mesmo se dissolve mantendo concentrações ativas com eficácia antiparasitária no plasma, o que permite atuar sobre certas larvas imaturas e latentes nas paredes intestinais e órgãos.

Modo de usar:

Produto de uso oral para ser administrado via ração.

Posologia:

Galinhas de postura, matrizes, avós comerciais, frango de corte:
Utilizar 500 gramas de produto para cada 1.000 quilos de ração durante cinco dias consecutivos.

Período de carência:

Não consumir a carne de animais tratados antes de decorridos 15 dias da última aplicação.

Apresentação:

Caixa contendo 5 quilos de produto (fracionado em sachê aluminizado de 250 gramas)