

FLUOQUIN

solução



Descrição:

FLUOQUIN SOLUÇÃO é um produto anti-infeccioso à base de uma quinolona carboxílica de terceira geração de ação rápida e eficaz para o tratamento de infecções dos trato digestivo e respiratório, sistema locomotor e nervoso em aves comerciais.

O produto **FLUOQUIN SOLUÇÃO** tem a seguinte vantagem: é de altíssima biodisponibilidade, por ser um produto em solução pronta para uso, em solução tamponada, o que proporciona uma rápida absorção e a obtenção dos níveis séricos desejáveis em curto espaço de tempo.

Composição:

Cada 100 mL do produto contém:

Enrofloxacino	20,00 g
Veículos q.s.p.	100,00 mL

Indicações:

FLUOQUIN SOLUÇÃO está indicado para o controle e o tratamento de:

Mycoplasma synoviae (artrite, aerosaculite, bursite), **Mycoplasma gallisepticum** (doença respiratória crônica, aerosaculite, sinusites), **E. coli** (colibaciloses, septicemia, doença respiratória crônica complicada), **Salmonella spp** (tifo, paratifo e pulorose), **Haemophilus gallinarum** (coriza infecciosa das aves), **Pasteurella multocida** (cólera aviária, pasteurelose), **Staphylococcus spp** e **Streptococcus spp**.

A critério do médico veterinário, outras infecções causadas por germes sensíveis à enrofloxacina.

Modo de usar:

Diluir 5 mL do produto em 20 litros de água para medicar 100 kg PV. O produto deverá ser fornecido aos animais por 3 a 5 dias, não devendo o tratamento ser interrompido até 48 horas após o desaparecimento dos sintomas. Em caso de Salmonelas o tratamento deverá ser de 5 dias. Administração via oral, através da água de bebida.

Posologia:

A posologia básica é de 10 mg de enrofloxacino por quilo de peso vivo por dia.

Período de carência:

Aves

7 dias antes do abate para frangos de corte e 10 dias para perus.

Tratamento em poedeiras

A produção de ovos no período do tratamento e até 3 dias após o término do tratamento deverá ter destinação exclusivamente industrial.

Apresentação:

Caixa contendo 24 frascos de 500 mL (tampa medidora de 10 mL).