

# FUNGITERM

comprimidos auto-incandescentes  
fungicida fumigante "tipo thermal dust"



<b>Composição:</b>	Cada comprimido de 3 g contém:	
	Thiabendazole .....	0,70 g
	Veículo q.s.p. ....	3,00 g
	Cada comprimido de 30 g contém:	
	Thiabendazole .....	7,00 g
	Veículo q.s.p. ....	30,00 g

- Indicações:**
- FUNGITERM** é um agente fumigante de ambientes fechados para uso em avicultura, e tem como principal característica ser um comprimido auto-incandescente que propicia a sublimação de seu princípio ativo e se espalha pelo ambiente de maneira uniforme, penetrando em locais que não são alcançados pela desinfecção comum.
- FUNGITERM** é indicado na prevenção da **aspergilose** em ambientes fechados em avicultura, para as seguintes condições:
- nos incubatórios, em qualquer tempo durante a incubação dos ovos, devendo ser utilizado pelo menos uma vez por semana ou de preferência toda vez que houver entrada de ovos;
  - na incubadora ou nascedouro, na época de transferência de ovos, antes da bicagem da casca (17-18 dias), com o objetivo de sanitizar o ambiente antes da eclosão;
  - em qualquer ambiente fechado toda vez que o médico veterinário julgar necessário.

**Modo de usar:**

**Comprimido de 3 g**

Separar a quantidade de comprimidos necessária para o ambiente a ser fumigado. Colocar todos os comprimidos sobre o disco de papel aluminizado - que acompanha o produto -, de modo que estejam amontoados ou lado a lado e que estejam todos em contato. Pegar um comprimido e forçar a chama do isqueiro - que acompanha a embalagem - sobre ele, na borda, até que se inicie sua queima. Ao se iniciar a queima do produto, apagar a chama com um leve assopro, para que ele auto-incandesça sem a presença de chama. Pegar este comprimido que começou a auto-incandescer e colocar sobre os outros. Durante a queima, se todos estiverem em contato, o processo de auto-incandescência passará para todos os outros comprimidos.

**Comprimido de 30 g**

Pegar a embalagem que contém o comprimido, retirar o rótulo superior, destacando-o pela área picotada, juntamente com a marcação onde está impresso o termo REMOVE, de coloração preta, na lateral da embalagem. Com este procedimento, uma parte do comprimido fica exposta pela borda. Forçar a chama do isqueiro - que acompanha o produto - sobre a área da embalagem onde o comprimido está exposto, pela borda, até que se inicie sua queima.

**Para as duas apresentações**

Quando o produto começar a soltar uma fumaça branca, que é o sublimado de thiabendazole, fechar o ambiente para que o produto se espalhe por todo o local. Quando o produto for utilizado dentro da incubadora, os ventiladores deverão estar desligados e as entradas de ar fechadas.

Após a queima total do produto, ligar novamente os ventiladores, para que a fumigação seja o mais uniforme possível.

Fumigar por 15 minutos, aproximadamente, e após este procedimento abrir as entradas de ar. Para qualquer ambiente fechado, fumigar por aproximadamente 15 minutos antes de abrir o ambiente.

**Posologia:**

**FUNGITERM** é indicado na proporção de 1 comprimido de 3 g para cada 2,5 m<sup>3</sup> ou 1 comprimido de 30 g para cada 25 m<sup>3</sup> de espaço a ser fumigado.

**Vantagens:**

- **FUNGITERM** não é corrosivo para os equipamentos.
- Não é tóxico para ovos embrionados.
- Tem amplo espectro de ação antifúngica.
- É altamente efetivo na diminuição de fungos patogênicos.
- Pode ser empregado em qualquer local que tenha problemas de contaminação fúngica e seja fechado.

**Apresentação:**

Caixa contendo 2 embalagens plásticas com 500 comprimidos de 3 g cada, acompanhada de isqueiro e discos de papel aluminizado para a queima do produto.

Caixa contendo 2 embalagens plásticas com 45 comprimidos de 30 g cada, acompanhada de isqueiro para a queima do produto.