

NORFLOXAZOL

30 solução



Descrição:

NORFLOXAZOL é um produto anti-infeccioso à base de uma quinolona carboxílica de terceira geração de ação rápida e eficaz para o tratamento de infecções dos trato digestivo e respiratório, sistema locomotor e nervoso em aves e suínos.

O produto NORFLOXAZOL tem as seguintes vantagens:

- é de altíssima biodisponibilidade, por ser um produto em solução pronta para uso, o que proporciona uma rápida absorção e a obtenção dos níveis séricos desejáveis em curto espaço de tempo;
- seu veículo contém o ácido acético glacial em concentração terapêutica, o que proporciona uma discreta estimulação das secreções brônquicas, facilitando a ação do princípio ativo mesmo nas infecções mais severas do sistema respiratório de aves e suínos.

Composição:

Cada 100 mL do produto contém:

Norfloxacino	30,00 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

Indicações:

Aves

Mycoplasma synoviae (artrite, aerosaculite, bursite), **Mycoplasma gallisepticum** (doença respiratória crônica, aerosaculite, sinusites), **E. coli** (colibaciloses, septicemia, doença respiratória crônica complicada), **Salmonella spp** (tifo, paratifo e pulorose), **Haemophilus gallinarum** (coriza infecciosa das aves), **Pasteurella multocida** (cólera aviária, pasteurelose), **Staphylococcus spp** e **Streptococcus spp**.

Suínos

E. coli (enterites, enterotoxemia, etc.), **Salmonella spp** (salmoneloses, enterites, septicemia), **Pasteurella multocida** e **Bordetella bronchiseptica** (rinite atrófica), **Haemophilus pleuropneumoniae** (pneumonia), **Mycoplasma hiponeumoniae** (pneumonia enzoótica).
Infecções mistas: **Mycoplasma spp + Pasteurella multocida** (síndrome MMA),
Mycoplasma spp + vírus (pneumonias viróticas).

Modo de usar e posologia:

Aves

O produto deve ser diluído na água de bebida de acordo com a posologia abaixo: a posologia básica é de 15 mg de norfloxacino-base por quilo de peso vivo por dia ou diluir 5 mL do produto em 20 litros de água para medicar 100 kg de peso vivo de 3 a 5 dias ou a critério do médico veterinário.

Suínos

Para uso na água de bebida, calcular uma dose de 7 mg de norfloxacino-base por quilo de peso vivo ao dia ou diluir 25 mL do produto em 50 litros de água para medicar 1.070 kg de peso vivo e fornecer aos animais por 3 a 5 dias ou a critério do médico veterinário.

Período de carência:

Aves e suínos: 5 dias antes do abate.

Apresentação:

Caixas contendo 24 frascos de 500 mL (tampa medidora de 10 mL).