



## Descrição:

TST-S PREMIX é um medicamento antibiótico e quimioterápico para uso na ração e se constitui na associação de três potentes agentes antimicrobianos, com espectro de ação complementares, com o objetivo de controlar infecções mistas dos tratos digestivo e respiratório de suínos e aves sensíveis à associação:

### CLORTETRACICLINA-TRIMETOPRIM-SULFADIAZINA.

O ácido cítrico quando adicionado tem a função de potencializar a ação do produto, por meio da diminuição da formação de quelatos da clortetraciclina com o cálcio e o magnésio presentes na dieta dos animais, melhorando sua absorção e atingindo níveis sanguíneos mais elevados.

## Composição:

Cada quilo do produto contém:

Clortetraciclina .....	200,00 g
Trimetoprim .....	30,00 g
Sulfadiazina .....	150,00 g
Excipientes q.s.p. ....	1000,00 g

## Indicações:

### Aves

**Mycoplasma synoviae** (artrite, aerosaculite, bursite), **Mycoplasma gallisepticum** (doença respiratória crônica, aerosaculite, sinusites), **E. coli** (colibaciloses, septicemia, doença respiratória crônica complicada), **Salmonella spp** (tifo, paratifo e pulorose), **Haemophilus gallinarum** (coriza infecciosa das aves), **Pasteurella multocida** (cólera aviária, pasteurelose), **Staphylococcus spp** e **Streptococcus spp**.

### Suínos

**E. coli** (enterites, enterotoxemia, etc.), **Salmonella spp** (salmoneloses, enterites, septicemia), **Pasteurella multocida** e **Bordetella bronchiseptica** (rinite atrofica), **Haemophilus pleuropneumoniae** (pneumonia), **Mycoplasma hiponeumoniae** (pneumonia enzoótica).  
Infecções mistas: **Mycoplasma spp** + **Pasteurella multocida** (síndrome MMA), **Mycoplasma spp** + vírus (pneumonias viróticas).

## Posologia:

### Tratamento

#### Suínos

Utilizar 50 mg da associação por quilo de peso vivo ao dia ou 2 kg do produto por tonelada de ração por 5 a 7 dias ou a critério do médico veterinário.

#### Aves

**Frangos de corte:** utilizar 50 mg da associação por quilo de peso vivo ao dia ou 1 kg a 1,5 kg do produto por tonelada de ração por 5 a 7 dias ou a critério do médico veterinário.

#### Poedeiras

Utilizar 50 mg da associação por quilo de peso vivo ao dia ou:

- da 1ª a 10ª semana, utilizar 1 kg do produto por tonelada de ração de 5 a 7 dias ou a critério do médico veterinário;
- da 11ª semana em diante, utilizar 1,5 kg do produto por tonelada de ração de 5 a 7 dias ou a critério do médico veterinário.

**Controle**

(a critério do médico veterinário)

**Matrizes**

Utilizar 1 kg do produto por tonelada de ração 5 a 7 dias antes e 5 a 7 dias após o parto.

**Leitões**

Utilizar 0,5 kg do produto por tonelada de ração do nascimento até 100 dias de idade.

**Período de carência:**

**Aves e suínos**

15 dias antes do abate.

Tratamento em poedeiras: a produção de ovos do período do tratamento e 5 dias após o término do tratamento deverá ter destinação exclusivamente industrial.

**Apresentação:**

Caixas com 10 kg (fracionados em sachês aluminizados de 250 g) e 25 kg do produto.