



DESCRIÇÃO:

DEFLEX é um produto à base de cefalexina monoidratada, que é uma cefalosporina semi-sintética, derivada do ácido 7-amino-cefalosporânico, que é obtido primariamente por meio da fermentação do **Cephalosporium acremonium**. As cefalosporinas constituem uma classe de antibióticos/B-lactâmicos, semelhantes às penicilinas, com as quais compartilham muitas características farmacológicas.

Apenas algumas cefalosporinas são estáveis em meio ácido, ou seja, não são atacadas pelos ácidos da digestão e podem ser utilizadas via oral. Neste grupo está a cefalexina, bem como a cefradina, a cefadroxila e a cefaclor. Estas podem ser usadas tanto por via oral como parenteral.

A cefalexina distribui-se largamente pela maioria dos fluidos e tecidos corporais, incluindo, rins, pulmões, articulações, ossos, tecidos moles e trato biliar (exceto líquido cefalorraquidiano).



COMPOSIÇÃO:

Cada frasco de 130 g contém:

Cefalexina (monoidratada)..... 100,00 g
Excipientes q.s.p..... 130,00 g

Cada frasco de 13 g contém:

Cefalexina (monoidratada)..... 10,00 g
Excipientes q.s.p..... 13,00 g

INDICAÇÕES:

DEFLEX está indicado para a prevenção e o controle de doenças respiratórias e entéricas em aves causadas por: **E. coli**, **Shigella spp**, **Klebsiella spp**, **Salmonella spp**, **Pasteurella spp**, **Enterobacter spp**, **Staphylococcus spp**, **Streptococcus spp**, **Haemophilus spp**, associação **E. coli** e **Mycoplasma gallisepticum** na ocorrência de doença respiratória crônica em aves.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

DEFLEX na apresentação contendo 130 g do produto é indicado para utilização exclusiva na água de bebida.

DEFLEX na apresentação contendo 13 g tem como indicação a utilização na água de bebida e também é preparado para viabilizar sua utilização junto com a vacina de Marek.

DEFLEX deve ser utilizado na dosagem de 0,5 a 1 frasco de 130 g reconstituído para cada 1.000 litros de água de bebida ao dia ou 10 mg a 20 mg de cefalexina monoidratada por quilo de peso vivo ao dia, durante 5 dias consecutivos. Se a dosagem for ministrada por quilo de peso vivo, deverá ser calculado o consumo de água para que o produto seja dividido de forma a proporcionar seu uso contínuo.

Utilização junto com a vacina contra a doença de Marek: Consultar departamento técnico DESVET.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

5 dias antes do abate.

APRESENTAÇÃO:

Embalagens contendo 20 frascos de 130 g e 30 frascos de 13 g do produto.