# MICOTERM

Comprimidos autoincandescentes

DESVET
Soluções terapêuticas para bem tratar

## DESCRIÇÃO:

O **Econazol**, princípio ativo do **MICOTERM**, pertence ao grupo dos imidazóis, tem como principal característica um apropriado efeito umidificante dos esporos de fungos, que são normalmente hidrófobos, como **Aspergillus spp** e **Penicillium spp**, permitindo então um maior contato com a droga.
Permanece ativo na presença de:

- matéria orgânica, como cama de frango, serragem de madeira, palha fresca, penas e outras matérias que, quando molhadas, permitem o crescimento de fungos;
- água com diferentes graus de dureza;
- em temperaturas elevadas, mantendo sua ação entre 4ºC e 45ºC, sendo que a uma temperatura de 25ºC se observou um aumento de sua atividade antifúngica, especialmente ante fungos do gênero Aspergillus;
- na presença de outros agentes desinfetantes, ectoparasitas, inseticidas ou agentes de limpeza.

## COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido de 3 g contém:
Econazol (nitrato)..... 0,50 g
Excipientes q.s.p..... 3,00 g

Cada comprimido de 30 g contém:
Econazol (nitrato)..... 5,00 g
Excipientes q.s.p..... 30,00 g

## INDICAÇÕES:

**MICOTERM** é um agente fumigante de ambientes fechados para uso em avicultura, e tem como principal característica ser um pó autoincandescente que, por meio deste processo, propicia uma sublimação de seu princípio ativo, que se espalha pelo ambiente de maneira uniforme, penetrando em locais que não são alcançados pela desinfecção comum.
**MICOTERM** é indicado na prevenção da aspergilose em ambientes fechados em avicultura, para as seguintes condições:

- nos incubatórios, em qualquer tempo durante a incubação dos ovos, devendo ser utilizado pelo menos uma vez por semana ou de preferência toda vez que houver entrada de ovos;
- na incubadora ou nascedouro, na época de transferência de ovos, antes da bicagem da casca (17-18 dias), com o objetivo de sanitizar o ambiente antes da eclosão;
- em qualquer ambiente fechado toda vez que o médico veterinário julgar necessário.

## MODO DE USAR E POSOLOGIA:

**MICOTERM** é indicado na proporção de um comprimido de 3 g para cada 5 $m^3$ ou 1 comprimido de 30 g para cada 50 $m^3$ de espaço a ser fumigado.
Para as duas apresentações forçar a chama do isqueiro, que acompanha as embalagens, sobre os comprimidos até que se inicie a queima.
Quando o produto abrir chama, apagar com um leve assopro e deixar que o produto antoincandeça.
Fumigar por 15 minutos.

## APRESENTAÇÃO:

Caixa contendo 2 embalagens plásticas com 500 comprimidos de 3 g cada.
Caixa contendo 2 embalagens plásticas com 45 comprimidos de 30 g cada.