

DESTRESS



Sedativo específico para suínos

DESVET
Soluções terapêuticas para bem tratar

DESCRIÇÃO:

DESTRESS é um produto à base de azaperone, um princípio ativo do grupo dos haloperidóis. Produz uma ação neuroléptica, específica em suínos, promovendo sedação psicomotora com narcose. Com isto as reações de defesa, fuga e agressão são reduzidas ou, até mesmo, completamente inibidas. Esta forma de ação diferencia o **DESTRESS** dos outros produtos existentes no mercado que produzem sedação sem narcose. A sedação sem narcose, dos outros produtos, não diminui a agressividade do animal e coloca em risco o tratador.



COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL do produto contém:

Azaperone.....	4,00 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

INDICAÇÕES:

DESTRESS está indicado nos seguintes casos de sedação de suínos: reagrupamento de porcos, porcas agressivas, situação de estresse, excitação durante o parto, colapso cardíaco agudo, intervenções diagnósticas e terapêuticas e pré-medicação anestésica local em pequenas intervenções cirúrgicas. O produto tem excelente campo de aplicação na suinocultura, na diminuição da agressividade e socialização de suínos recém-agrupados.

DESTRESS pode ser utilizado como anestésico local para pequenas intervenções cirúrgicas. O efeito máximo do produto se observa 5 a 15 minutos após a injeção em animais jovens e em 30 minutos em animais adultos, durando em torno de 1 a 3 horas, dependendo da dose e do peso do animal. Nos primeiros minutos após a injeção, recomenda-se deixar os animais em completa tranquilidade para a obtenção de um melhor efeito do medicamento.

Após 16 horas, o produto é completamente eliminado do organismo do animal. **DESTRESS** é um produto absolutamente seguro, podendo ser utilizado em suínos de qualquer idade e em fêmeas em gestação. Sua margem de segurança é de 20 vezes a dose terapêutica.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

DESTRESS deve ser administrado por via intramuscular profunda. Para isso, usar uma agulha longa, que será introduzida verticalmente atrás da orelha, nas costas ou na coxa. Nos casos em que a injeção é realizada no tecido adiposo, a sedação pretendida não é atingida.

A posologia básica segue as especificações abaixo, em mililitros por kg de peso:

Porcas agressivas.....	1 mL para cada 20 kg de peso
Reagrupamento	1 mL para cada 20 kg de peso
Estresse	0,5 mL a 1 mL para cada 20 kg de peso
Distrofia muscular.....	0,5 mL a 1 mL para cada 20 kg de peso

Intervenções obstétricas:

Cesariana com anestesia local	1 mL a 2 mL para cada 20 kg de peso
Sobrecarga cardíaca	1 mL a 2 mL para cada 100 kg de peso

Obs.: Em porcos não castrados, não ultrapassar 1 mL para cada 20 kg de peso.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 1 dia após a última aplicação.

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 5 frascos de 20 mL.



(11) 2941-5923

www.desvet.com.br

Set/2020